

Poprzez różne kursy, warsztaty, prelekcje, pokazy, na zasadzie własnych prób i błędów co roku przybywa osób, które zaczynają się zajmować bartnictwem. Trzeba mieć nadzieję, że dzięki zainteresowaniu bartnictwem zaroi się od barci i od pszczół w lasach. Trzeba też mieć nadzieję, że będzie rosła jakość lasów pod względem atrakcyjności dla owadów zapylających.

Urozmaicenie lasów to ważne zadanie dla całej braci bartnej, która powinna dopingować w tej kwestii leśników. Często zdarza się, że na wielu obszarach leśnych istnieją tzw. zielone pustynie, gdzie skład gatunkowy drzew, ich wiek, uboga ilość krzewów, krzewinek, roślin runa sprawiają, że są zupełnie nieużyteczne dla pszczół i reszty leśnego towarzystwa. Jeśli poza zasięgiem lotu pszczół nie występują dogodniejsze siedliska, nie warto dźiać barci w takich miejscach, ponieważ pszczoły będą miały niedostateczną ilość pokarmu.

Wydajność miodowa zespołów leśnych w warunkach polskich

(wg. Szklanowskiej 1973, 1979)*


Zespół leśny	Średnia wydajność miodowa (kg/ha)
Bór bagienny <i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i>	196,8
Bór mieszany sosnowo-dębowy <i>Pineto Quercetum</i>	126,0
Bór sosnowy świeży <i>Peucedano-Pinetum typicum</i>	76,8
Bór sosnowy suchy <i>Peucedano-Pinetum cladonietosum</i>	62,5
Bór jodłowy <i>Albietetum polonicum</i>	36,7
Grąd bukowo-grabowy <i>Fageto-Carpinetum</i>	23,8
Grąd dębowo-grabowy <i>Querceto-Carpinetum</i>	8,4
Świetlista dąbrowa <i>Querceto-Potentilletum albae</i>	4,0

Pewną ciekawostką są wyniki badań przeprowadzone w celu określenia przydatności kilku rodzajów zbiorowisk leśnych (typów lasu) dla pszczół pod względem wydajności miodowej. Najwartościowszym zbiorowiskiem leśnym są bory bagienne. Zapewne pierwsze miejsce boru bagiennego wynika ze stosunkowo bogatej w tym zespole warstwy runa, które tworzą m.in. bagno zwyczajne, borówka łochynia, borówka czernica, wrzos zwyczajny, borówka brusznica, żurawina błotna. Niestety w grądach wzięto pod uwagę jedynie rośliny runa i dlatego zajmują przedostatnie miejsce. W tym typie lasu lipa drobnolistna jest jednym z gatunków tworzących drzewostan. W zależności od typu w grądach występują również klony, jabłonie, wierzby iwy.

Las dla pszczół i wspomnienie kursu.

Wpisany przez administrator

wtorek, 29 grudnia 2015 20:44 - Poprawiony wtorek, 29 grudnia 2015 21:02



złoty, 29 grudnia 2015 21:02

Las dla pszczoł i wspomnienie kursu.

Wpisany przez administrator

wtorek, 29 grudnia 2015 20:44 - Poprawiony wtorek, 29 grudnia 2015 21:02



Opis: Wpisany przez administrator, poprawiony wtorek, 29 grudnia 2015 21:02

Wpisany przez administrator
wtorek, 29 grudnia 2015 20:44 - Poprawiony wtorek, 29 grudnia 2015 21:02

